

Jazykový tandem Pracovní list

Vakcinace (Očkování)


1. Spojte jména nemocí v češtině a v angličtině:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Tuberkulóza | a) rubella, German measles |
| 2. Záškrt | b) hepatitis |
| 1. Tetanus | c) mumps |
| 2. Černý kašel | d) measles |
| 3. Dětská obrna | e) scarlet fever |
| 4. Žloutenka | f) chicken-pox |
| 5. Neštovice | g) pertussis |
| 6. Plané neštovice | h) small-pox |
| 7. Příušnice | ch) tetanus |
| 8. Spalničky | i) polio |
| 9. Spála | j) diphtheria |
| 10. Zarděnky | k) tuberculosis |
| 11. Žloutenka | l) chicken-pox |

2. Podívejte se na tabulku s vakcinacemi. Jaké očkování musí mít děti ve věku 0–13 měsíců ve Vaší zemi?

TERMÍN VĚK DÍTĚTE	POVINNÉ OČKOVÁNÍ		
	NEMOC	OČKOVACÍ LÁTKA	
od 4. dne - 6. týdne	Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)	BCG vaccine SSI	
od 6. týdne			4. měsíc
od 9. týdne (2. měsíc)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B	Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima Infanrix hexa # (2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)
			11.-13. měsíc
			Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu b Hexacima Infanrix hexa (3. dávka)

3. Jaké jsou plusy a mínusy vakcinace? Je to prevence, nebo riziko? Diskutujte s partnerem/partnerkou.



4. Nechali byste svoje dítě očkovat proti meningokoku? Podívejte se na výsledky ankety časopisu Týden (Zdroj: <https://www.tyden.cz/anketa/?page=13&rubrika=325>), diskutujte a dokončete větu:

Určitě ano.	29 %
Myslím, že ano.	33 %
Ne, jde jen o lobby farmaceutických firem.	38 %

Svoje dítě bych proti meningokoku očkovat nechal(a) / nenechal(a), protože _____.

5. Jaká je nejlepší prevence onemocnění? Napište!

- očkování
- jíst vitamíny
- _____
- _____
- _____
- _____